



NESTOR COHENCA, DDS, FIADT
SHAHD NAWARI, DMD, MS
1029 MARKET SRT. STE 102
KIRKLAND, WA 98033

Recomendaciones para el cuidado posterior a la terapia de conducto radicular

¡Felicitaciones! Al salvar su diente con un tratamiento de endodoncia, ha dado un paso significativo hacia una mejor salud bucal. El sistema de conducto radicular dentro de su diente ha sido limpiado, desinfectado, moldeado y sellado a fondo.

1. Completamos su terapia de conducto radicular con una restauración de acceso temporal. Por favor llame de inmediato a su dentista para fijar una cita para la restauración permanente en su diente. Cualquier retraso en la obtención de una restauración permanente puede hacer que el diente se fracture o puede hacer que el diente se vuelva a infectar.
2. Completamos su terapia de conducto radicular con una restauración de acceso permanente. No es necesario que haga un seguimiento con su dentista para este diente.

Es normal sentir algo de sensibilidad en el área durante los próximos días a medida que su cuerpo se somete al proceso de recuperación natural. También puede sentir algo de sensibilidad en la mandíbula por mantenerla abierta durante un período prolongado de tiempo. Estos síntomas son temporales y suelen responder muy bien a los analgésicos de venta libre, como la aspirina, el paracetamol (Tylenol), el ibuprofeno Advil o Motrin) y el naproxeno sódico (Aleve). Tome los analgésicos según las instrucciones y antes de que desaparezca el efecto de la anestesia y continúe tomándolos durante dos o tres días según las indicaciones. Seguir esta recomendación puede disminuir sustancialmente sus molestias después del tratamiento. Los medicamentos narcóticos, si se recetan, pueden causarle somnolencia, y se debe tener cuidado al operar maquinaria peligrosa o conducir un automóvil.

Es posible que su diente continúe sintiéndose ligeramente diferente de sus otros dientes durante algún tiempo después de que se haya completado el tratamiento de endodoncia. Sin embargo, si tiene dolor intenso o presión que dura más de unos pocos días, comuníquese con nuestra oficina de inmediato. Asegúrese de cepillarse los dientes y usar hilo dental como lo haría normalmente.

Póngase en contacto con nuestra oficina de inmediato si presenta alguno de los siguientes:

1. Hinchazón visible dentro o fuera de la boca.
2. Reacción alérgica a un medicamento, como sarpullido, urticaria o picazón (las náuseas no son una reacción alérgica).
3. Retorno de los síntomas originales.
4. Dolor intenso.
5. La mordida se siente alta o desigual.
6. Anestesia de los tejidos que persiste más allá de unas pocas horas después del procedimiento.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos al (425) 440-2000.

¡Gracias por elegir Prime Endodontics, le deseamos una recuperación rápida y sin problemas!